

Microemulsion for cosmetic or pharmaceutical use.**Publication number:** EP0334777 (A1)**Publication date:** 1989-09-27**Inventor(s):** WAGINAIRE LUCIEN; DENIS JOEL**Applicant(s):** GATTEFOSSE ETS SA [FR]**Classification:**

- **International:** A61K8/06; A61K8/39; A61K9/107; A61Q19/00; B01F17/34;
A61K8/04; A61K8/30; A61K9/107; A61Q19/00; B01F17/34;
(IPC1-7); A61K7/00; A61K7/48; A61K9/10

- **European:** A61K8/06; A61K8/39; A61K9/107D; A61Q19/00

Application number: EP19890420094 19890316**Priority number(s):** FR1989003839 19890318**Also published as:** EP0334777 (B1) FR2628632 (A1) ES2038435 (T3)**Cited documents:** FR2524897 (A1) FR1274354 (A) EP0087062 (A2) EP0216557 (A2)**Abstract of EP 0334777 (A1)**

The microemulsion is of the type containing a water-soluble phase and a lipid phase, comprising, in the form of a mixture: . at least one water-soluble phase, . at least one lipid phase, . at least one surfactant, . at least one cosurfactant, characterised: - in that the surfactant is a mixed ester of glycerol and polyethylene glycol and represents at least ten per cent (10%) by weight of the mixture; - in that the cosurfactant is an ester of polyglycerol and a liquid fatty acid, which is in the mixture in a smaller proportion than that of the surfactant and represents at least five per cent (5%) by weight of the mixture; - and in that the lipid compound possesses a hydrophilic/lipophilic balance not exceeding three. Use envisaged: pharmaceutical excipients or cosmetological bases.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

18



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

19 Numéro de publication:

0 334 777
A1

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 89420094.8

20 Int. Cl.⁴: A 61 K 9/10
A 61 K 7/00, A 61 K 7/48

22 Date de dépôt: 16.03.89

30 Priorité: 18.03.88 FR 8803639

33 Date de publication de la demande:
27.09.89 Bulletin 89/39

34 Etats contractants désignés:
BE CH DE ES FR GB IT LI NL

71 Demandeur: GATTEFOSSE S.A.
36 chemin de Genas
F-69800 Saint Priest (FR)

72 Inventeur: Waginaire, Lucien
Le Buclet
F-38460 Chamagnieu - Cremieu (FR)

Denis, Joel
Route de Charly Vouries
F-69390 Vernalson (FR)

74 Mandataire: Laurent, Michel et al
Cabinet LAURENT 20, rue Louis Chirpaz B.P. 32
F-69131 Ecully Cédex (FR)

54 Microémulsion à usage cosmétique ou pharmaceutique.

57 Microémulsion à usage cosmétique ou pharmaceutique, du type comportant une phase hydrosoluble et une phase lipidique comprenant en mélange :

- . au moins une phase hydrosoluble,
- . au moins une phase lipidique,
- . au moins un agent tensio-actif,
- . au moins un agent cotensioactif,

caractérisée :

- en ce que l'agent tensio-actif est un ester mixte de glycérol et de polyéthylène glycol et représente au moins dix pour cent (10 %) en poids du mélange ;
- en ce que l'agent cotensioactif est un ester de polyglycérol et d'un acide gras liquide, qui est dans le mélange en proportion inférieure à celle de l'agent tensio-actif, en représente au moins cinq pour cent (5 %) en poids du mélange ;
- et en ce que le composé lipidique présente une balance hydrophile/lipophile d'au plus trois.

Application envisagée : excipients pharmaceutiques ou bases cosmétologiques.

EP 0 334 777 A1

Description

MICROEMULSION A USAGE COSMETIQUE OU PHARMACEUTIQUE

L'invention concerne une nouvelle microémulsion destinée notamment à être utilisée dans l'industrie pharmaceutique ou dans la cosmétologie.

Dans la suite de la description et dans les revendications, par "microémulsion", on désigne une solution micellaire homogène transparente, formée de plusieurs constituants, comprenant généralement deux phases non miscibles, à savoir une phase hydrosoluble et une phase lipidique. En pratique, ces émulsions qui comportent des particules dont les dimensions sont comprises entre cent et cinq cents angströms, sont toujours composées de quatre constituants, à savoir respectivement :

- une phase hydrosoluble, telle que de l'eau, un alcool, un polyol, du glycérol, voire des mélanges de ces composés ;

- une phase huileuse, dite aussi lipidique, telle que huiles minérales, végétales, animales ou synthétiques ;

- au moins un agent tensio-actif ;

- au moins un agent cotensioactif.

Comme on le sait, les "agents tensio-actifs" sont des composés chimiques à caractère hydrophile prononcé, destinés à provoquer la formation de micelles. Un agent tensio-actif utilisé seul permet seulement de former une solution micellaire.

En revanche, les "agents cotensioactifs", dénommés également parfois agents cosurfactants, sont également des composés chimiques, mais à caractère plus hydrophobe, destinés à provoquer la solubilisation mutuelle des phases aqueuses et huileuses dans une microémulsion.

Comme on le sait, les microémulsions nécessitent l'emploi combiné d'agents tensio-actifs et d'agents cotensioactifs.

Les microémulsions ont été largement étudiées pour la récupération du pétrole. Dans ce but, elles contiennent de fortes proportions d'agents tensio-actifs agressifs, inutilisables dans les applications pharmaceutiques ou cosmétiques. Dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques, on utilise très largement des émulsions. Toutefois, celles-ci sont composées de particules de dimensions supérieures ou égales à un micromètre. La difficulté réside dans leur formation et surtout dans leurs stabilités thermiques et mécaniques.

L'invention pallie ces inconvénients. Elle vise une microémulsion particulièrement adaptée à l'industrie pharmaceutique ou à la cosmétologie, qui soit compatible avec de telles applications, présente une bonne innocuité tant par voie topique, orale, rectale ou transcutanée, et une stabilité thermodynamique, sans commune mesure avec celle des émulsions traditionnelles.

Cette microémulsion à usage pharmaceutique ou cosmétique, du type comportant une phase hydrosoluble et une phase lipidique, comprenant essentiellement en mélange :

- au moins une phase hydrosoluble,
- au moins une phase lipidique,

- au moins un agent tensio-actif à base de polyéthylène glycol,

- au moins un agent cotensioactif à base de polyglycérol,

se caractérise :

- en ce que l'agent tensio-actif est un ester mixte de glycérol et dudit polyéthylène glycol, et représente au moins dix pour cent (10 %) en poids du mélange ;

- en ce que l'agent cotensioactif est un ester dudit polyglycérol et d'acides gras liquides, qui est dans le mélange en proportion inférieure à celle de l'agent tensio-actif, en représente au moins cinq pour cent (5 %) en poids du mélange ;

- et enfin, en ce que le composé lipidique présente une balance hydrophile/lipophile d'au plus trois.

En d'autres termes, l'invention consiste à avoir sélectionné des agents tensio-actifs et des agents cotensioactifs particuliers, qui une fois combinés avec une phase hydrosoluble et une phase lipidique forment une microémulsion stable, présentant une excellente innocuité, une bonne tolérance cutanée, une quasi absence de toxicité et aucune action détergente. De la sorte, on peut les utiliser avec succès et sans danger tant dans l'industrie pharmaceutique que dans la cosmétologie. Ainsi, l'invention réside à avoir sélectionné des microémulsions particulières pour l'industrie de la cosmétologie et/ou pharmaceutique, et plus précisément à avoir sélectionné des agents tensio-actifs et agents cotensioactifs spécifiques qui, combinés entre eux, permettront de réaliser des microémulsions présentant une excellente innocuité.

Dans le description et dans les revendications :

- par "composé à action détergente", on désigne les composés chimiques destinés à nettoyer par mouillage, solubilisation ou déplacement des saletés ou des souillures et possédant un pouvoir émulsionnant élevé ;

- par "bonne tolérance cutanée", on entend une absence ou une faible irritation par application sur la peau ou sur les muqueuses ;

- on dit "qu'un composé présente une quasi-absence de toxicité" lorsque sa dose létale (DL50) est très élevée.

- enfin, par "ester mixte de glycérol et de polyéthylène glycol", on désigne des composés ne présentant que des liaisons esters, à l'exclusion de toutes autres liaisons actives, telles que notamment éthers.

Le plus généralement, l'agent tensio-actif représente au moins quinze pour cent (5 %) en poids du mélange et agent cotensioactif et la proportion d'agent cotensioactif est voisine de la moitié de celle de l'agent tensio-actif.

Avantageusement, en pratique :

- pour que les produits tensio-actifs et/ou cotensioactifs présentent une bonne innocuité, c'est-à-dire une excellente tolérance cutanée, et une quasi-absence de toxicité, ils doivent être préparés avec des matières premières aussi pures que possible et en utilisant des catalyseurs non toxiques et non agressifs et enfin, ils doivent être purifiés ;

- dans l'agent tensio-actif, le polyéthyléneglycol a un poids moléculaire moyen compris entre 100 et 1000 et est de préférence est voisin de 400, ce qui lui confère un caractère non détergent ; comme déjà dit, cet agent tensio-actif doit représenter en poids au moins dix pour cent (10 %) du poids de la microémulsion ; en effet, on a constaté que si ce poids est inférieur à dix pour cent (10 %), on obtient non plus une microémulsion, mais simplement une émulsion traditionnelle, c'est-à-dire opaque, alors que si cette proportion est plus élevée, la dispersion en sera d'autant plus facilitée, mais le coût en sera d'autant plus élevé, sans amélioration proportionnelle ; on obtient de bons résultats avec une proportion d'agent tensio-actif voisin de vingt (20 %) ;

- dans l'agent cotensioactif, le polyglycérol a un poids moléculaire compris entre 100 et 1000 et l'acide gras est avantageusement un acide gras liquide, tel que par exemple l'acide oléique ou l'acide isostéarique, seuls ou en mélange ; comme déjà dit, la proportion de cet agent cotensioactif est généralement inférieure à celle de l'agent tensio-actif, mais supérieure à cinq pour cent (5 %), de préférence dix pour cent (10 %) ;

- comme phase lipidique, on utilise tout composé huileux liquide d'usage courant pour les applications pharmaceutiques et/ou cosmétiques, ayant une balance hydrophile/lipophile (HLB) au plus égale à trois, de préférence voisine de deux ;

- la phase hydrosoluble peut être de l'eau ou tout autre composé à caractère hydrosoluble, tels que les alcools, les polyols, le glycérol., seuls ou en mélange ;

- enfin, la microémulsion peut comporter également :

. des principes actifs pharmaceutiques que l'on désire introduire ultérieurement en l'état ou en solution dans un solvant approprié ;

. des agents conservateurs, tels que notamment des agents antiseptiques,

. des parfums, notamment pour l'application en cosmétologie,

. des dérivés biologiques ou végétaux,

. d'autres additifs cosmétiques.

Pour la préparation des émulsions, on a déjà proposé d'utiliser des agents tensio-actifs à base de polyéthyléneglycol ou à base d'ester de polyglycérol et d'acide gras (voir par exemple EPA-0216557 et US-A-4 555 524 et 4 690 774). L'invention ne vise pas ces composés dans leur application comme agents tensio-actifs, mais consiste à avoir déterminé qu'en mélangeant certains de ces composés spécifiques dans des proportions appropriées, à savoir agents tensio-actifs majoritaires mais au moins égal à 10 %, on pouvait préparer des micro-émulsions stables présentant une excellente innocuité, ce que l'on ne savait faire jusqu'alors, à condition également que la balance hydrophile/lipophile (HLB) de la phase lipidique soit au plus égale à 3 et de préférence voisine de 2.

Le mélange de ces différents composés s'effectue dans des proportions préalablement déterminées par l'expérience, sans précaution particulière ou ordre spécifique, notamment à température

ambiante, sous faible agitation.

La manière dont l'invention peut être réalisée et les avantages qui en découlent ressortiront mieux des exemples de réalisation qui suivent, donnés à titre indicatif et non limitatif.

Exemple 1 :

Dans un becher, on mélange à température ambiante :

10 - 32,9 grammes d'un agent tensio-actif constitué par un coester en C8/C10 de glycérol et de polyéthyléneglycol de poids moléculaire moyen 400, commercialisé par le Demandeur sous la dénomination "LABRASOL" ;

15 - 13,2 grammes d'un agent cotensioactif constitué par un méthyl-2 heptadécanoate de polyglycérol commercialisé par le Demandeur sous la dénomination "PLUROL ISOSTEARIQUE" ;

20 - 41,8 grammes d'eau déminéralisée ;

20 - 12,0 grammes de méthyl-2 heptadécanoate de méthyl-2 heptadécanoyle (composé lipidique) de HLB voisin de 2, commercialisé par le Demandeur sous la dénomination "ISOSTEARATE D'ISOSTEARYLE" ;

25 - 0,1 gramme d'un agent conservateur antiseptique commercialisé par ROHM et HAAS sous la dénomination "KATHON-CG", et constitué par une solution aqueuse de :

30 . 5-chloro 2-méthyl 4-isothiazoline 3-one
 . et de 2-méthyl 4-isothiazoline 3-one, complexées par du chlorure de magnésium et stabilisées par du nitrate de magnésium.

A température ambiante, on agite ce mélange à la main pendant cinq minutes environ.

35 On obtient alors une microémulsion transparente, fluide et limpide, légèrement teintée en jaune, stable dans une gamme de température comprise entre -20°C et +50°C.

40 Cette microémulsion convient parfaitement comme excipient pour l'industrie pharmaceutique ou comme base pour la cosmétologie du fait de sa bonne stabilité et de son excellente innocuité cutanée.

Exemple 2 :

45 Dans un bœcher, on mélange à température ambiante :

50 - 32,1 grammes de l'agent tensio-actif LABRASOL du Demandeur décrit à l'exemple 1 ;

50 - 16,1 grammes du même agent cotensioactif "PLUROL ISOSTEARIQUE" qu'à l'exemple 1 ;

55 - 10,7 grammes du composé lipidique décrit à l'exemple 1, commercialisé par le Demandeur sous la dénomination "ISOSTEARATE D'ISOSTEARYLE" ;

60 - 2,2 grammes d'huile d'amandes douces ;

- 1,1 gramme d'huile de germes de céréales ;

- et enfin 0,5 gramme d'un parfum commercialisé par le Demandeur sous la dénomination "ROSALEVRE -MA 1445".

On ajoute ensuite à ce mélange :

65 - 26,8 grammes d'eau déminéralisée ;

- 8,0 grammes d'un extrait placentaire aqueux commercialisé par le Demandeur sous la dénomination "PHYLERM FILATOV" ;

- 2,4 grammes d'extrait hydroglycolique **Calendula**, commercialisé le Demandeur sous la dénomination **"VEGETOL MCF 774"** ;
- enfin, 0,1 gramme de l'agent conservateur antiseptique de l'exemple 1.

Après agitation à la main pendant cinq minutes environ à température ambiante, on obtient une microémulsion limpide de couleur jaune orangée, particulièrement adaptée comme préparation cutanée d'hygiène corporelle.

Exemple 3 :

Dans 22,5 grammes d'eau déminéralisée, on disperse 5,8 grammes d'un composé commercialisé par le Demandeur sous la dénomination **"ATE-LOGLYCANE"**, et 0,1 gramme du même agent conservateur antiseptique qu'à l'exemple 1.

On ajoute toujours à température ambiante dans cette dispersion :

- 53,1 grammes de l'agent tensio-actif de l'exemple 1 ;
- 9,7 grammes de l'agent cotensioactif de l'exemple 1 ;
- 9,0 grammes du composé lipidique **ISOSTEARATE d'ISOSTEARYLE** de l'exemple 1.

On mélange doucement à température ambiante pendant cinq minutes.

On obtient une microémulsion stable, limpide, de couleur jaune, utilisable pour des applications capillaires.

Exemple 4 :

Dans 15,5 grammes de propylène glycol, on mélange :

- 29,9 grammes de l'agent tensio-actif dénommé **LABRASOL** décrit à l'exemple 1,
- 42,5 grammes de l'agent cotensioactif dénommé **"PLUROL ISOSTEARIQUE"**, également décrit à l'exemple 1,
- 12,1 grammes de la phase lipidique **"ISOSTEARATE d'ISOSTEARYLE"**, décrite aussi à l'exemple 1.

On mélange à température ambiante pendant cinq minutes sous faible agitation.

On obtient une microémulsion anhydre, stable, limpide, de couleur jaune, utilisable avec succès comme excipient cosmétologique, notamment pour les soins de 35 la peau.

Les microémulsions préparées conformément à l'invention présentent de nombreux avantages. On peut citer :

- grande innocuité, notamment cutanée, transcutanée, rectale ou orale ;
- excellente stabilité aux températures usuelles d'emploi, c'est-à-dire dans une gamme allant de -30 °C à +80 °C ;
- absence de séparation en cas de congélation, ce qui facilite la conservation ;
- amélioration de la biodisponibilité des principes actifs pharmaceutiques ;
- possibilité de stérilisation par la chaleur et par filtration stérilisante.

Ces microémulsions peuvent avoir des présentations variées, telles que microémulsions traditionnelles, mousses, formes pressurisées, aérosols, gélules, capsules, ampoules, etc. .

De la sorte, elles peuvent être utilisées avec succès dans toutes les applications cosmétiques ou pharmaceutiques externes cutanées (topiques), internes (orales, rectales, injectables), ou comme supports, vecteurs, excipients à forte compatibilité physiologique.

Revendications

1/ Microémulsion à usage cosmétique ou pharmaceutique, du type comportant une phase hydrosoluble et une phase lipidique comprenant en mélange :

- . au moins une phase hydrosoluble,
- . au moins une phase lipidique,
- . au moins un agent tensio-actif à base de polyéthylène glycol,
- . au moins un agent cotensioactif à base de polyglycérol,

caractérisée :

- en ce que l'agent tensio-actif est un ester mixte de glycérol et dudit polyéthylène glycol et représente au moins dix pour cent (10 %) en poids du mélange ;
- en ce que l'agent cotensioactif est un ester dudit polyglycérol et d'un acide gras liquide, qui est dans le mélange en proportion inférieure à celle de l'agent tensio-actif, en représente au moins cinq pour cent (5 %) en poids du mélange ;
- en ce que la phase lipidique présente une balance hydrophile/lipophile d'au plus trois.

2/ Microémulsion selon la revendication 1, caractérisée en ce que le polyéthylène glycol de l'agent tensio-actif a un poids moléculaire moyen voisin de 400.

3/ Microémulsion selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'agent cotensioactif est un ester d'un acide gras liquide et d'un polyglycérol ayant un poids moléculaire compris entre 100 et 1000.

4/ Microémulsion selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'acide gras liquide est choisi dans le groupe comprenant l'acide oléique et l'acide isostéarique.

5/ Microémulsion selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la phase lipidique a une balance hydrophile/lipophile voisine de 2.

6/ Microémulsion selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la phase hydrosoluble est choisie dans le groupe comprenant l'eau, les alcools, les polyols, le glycérol, seuls ou en mélange.

7/ Microémulsion selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le mélange comporte également des principes actifs pharmaceutiques, seuls ou en solution dans un solvant.

8/ Microémulsion selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que l'agent tensio-actif représente au moins quinze pour cent (15 %) en poids du mélange, et en ce que la proportion de l'agent cotensioactif est voi-

sine de la moitié de celle de l'agent tensio-actif.

9/ Microémulsion selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le mélange comporte également des composés choisis dans le groupe constitué par les agents conservateurs, les parfums, les dérivés biologiques ou végétaux, les additifs cosmétiques.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

5



EP 89 42 0094

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
Y	FR-A-2 524 897 (POLA CHEM. INDUS.) * Revendications; page 8, lignes 7-17 *	1-9	A 61 K 9/10 A 61 K 7/00 A 61 K 7/48
Y	FR-A-1 274 354 (E. MAHLER et al.) * Page 3, colonne de gauche, points 1,2; revendications *	2,6,7,9	
D,Y	EP-A-0 087 062 (DOLORGIET GmbH & CO.) * Résumé; page 3, alinéa 3; page 3, exemple * & US-A-4 555 524	2,6,7,9	
D,Y	EP-A-0 216 557 (CHESEBROUGH-POND'S) * Page 4, lignes 1-26 *	3-9	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)
			A 61 K
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Ets de la recherche LA HAYE		Date d'établissement de la recherche 28-05-1989	Examinateur BERTE M.J.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons G : membre de la même famille, document correspondant	